

▼ STEGLATRO®

ERTUGLIFLOZINA PARA LA DIABETES MELLITUS 2

La última gliflozina



IMPORTANTE MEJORA TERAPÉUTICA



MODESTA MEJORA TERAPÉUTICA



SÓLO APORTA EN SITUACIONES CONCRETAS



NO SUPONE AVANCE TERAPÉUTICO



INFORMACIÓN INSUFICIENTE

+
FICHA TÉCNICA

¿QUÉ ES?

Antidiabético oral.

INDICACIÓN

Diabetes mellitus 2 en adultos, como tratamiento en combinación o en monoterapia para pacientes intolerantes o con contraindicación a metformina.

POSOLÓGIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Un comprimido al día con o sin alimentos. Dosis inicial de 5 mg/día se puede aumentar a 15 mg/ día.

POBLACIONES ESPECIALES

No iniciar con tasa de filtrado glomerular estimado (TFGe) <60 ml/min/1,73 m² (menor eficacia) y suspender con TFGe <45 ml/min/1,73 m².

EFICACIA

Reducción de la HbA1c entre 0,43 y 1,16 a las 26 o 52 semanas. En pacientes con insuficiencia renal moderada ertugliflozina no es más eficaz que placebo en la disminución de la HbA1c. Se encontraron reducciones significativas del peso (ajustadas con placebo) de entre 1,6 y 4,3 Kg en los pacientes de los ensayos. En los estudios frente a comparador activo, solo la pauta de ertugliflozina 15 mg+metformina ha demostrado no inferioridad respecto a metformina +glimepirida tras 52 semanas de tratamiento, pero la dosis media de glimepirida fue de 3 mg/día y el porcentaje de valores perdidos fue del 20%.

Los efectos adversos más frecuentes son infecciones micóticas genitales (dosis-dependiente), diuresis osmótica e hipoglucemias. Debido al grupo terapéutico al que pertenece se recomienda precaución con el riesgo de hipovolemia y deshidratación, cetoacidosis diabética, amputaciones de extremidades inferiores, infecciones del tracto urinario y al emplearlo en pacientes de edad avanzada o con insuficiencia cardíaca.

RIESGOS

Los efectos adversos más frecuentes son infecciones micóticas genitales (dosis-dependiente), diuresis osmótica e hipoglucemias. Debido al grupo terapéutico al que pertenece se recomienda precaución con el riesgo de hipovolemia y deshidratación, cetoacidosis diabética, amputaciones de extremidades inferiores, infecciones del tracto urinario y al emplearlo en pacientes de edad avanzada o con insuficiencia cardíaca.

PRESENTACIONES

Steglatro® 5mg 28 comprimidos (PVP+IVA: 47,46€)
Steglatro® 15mg 28 comprimidos (PVP+IVA: 47,46€)

Poco que aportar. A la espera de que se conozcan sus resultados de morbi-mortalidad cardiovascular

INFORME

Coste tratamiento/día a dosis máxima (€)

