


# Profesionalentzat MAPAC gomendioak

## Plaketen transfusio profilaktikoak



<10 X  
10<sup>9</sup>/L

Helduen eta urtebetetik gorako haurren kasuan, ez egin transfusio profilaktikorik plaketa-zenbaketa >10 x 10<sup>9</sup>/l denean.

Beti ere, ez badago odoljarioa izateko arrisku-faktorerik, zantzurik edo sintomarik, edo prozedura inbaditzaileak egin behar ez badira.



Ez monitorizatu transfusio ondoko plaketa zenbaketa, baldin eta errefraktariorotasuna, ezegonkortasuna edo odoljarioa ez badago. Transfusioa egiteko, eguneko lehen laborategi balioan oinarritu.



### Egunean dosi bakarra:

Ez egin transfusio profilaktikorik egunean behin baino gehiagotan.



### Dosi txikiak:

Plaketa-dosi txikiak erabili (1/2 aferesi/pool) transfusio profilaktikoan (bereziki pisua < 50 kg bada) edo, gehienez ere, tarteko dosia (1 aferesi/pool) edo baliokidea haurren kasuan.

### EZ ERABILI DOSI BIKOITZA



### Egoki erabili, baliabide mugatua baita

Plaketen eta ondorioz, plasmaren eskuragarritasuna handitzen da. Behar duten paziente guztientzat badagoela bermatzen da horrela.



### Alferrikako arriskuak saihesten dira

Pazienteen esposizioa eta transfusio-erreakzioak izateko arriskua murrizten da, baita aloimmunizazioa, infekzioak edo etorkizuneko plaketa-transfusioekiko errefraktariorotasuna izateko arriskua ere.

### Odola emateko baldintzak:

- ✓ 18 eta 65 urte bitartean izatea
- ✓ 50 kg baino gehiago pisatzea
- ✓ Medikuz-azterketa laburra

### Odola eman aurretik:

- ✓ Ez jan gantz asko
- ✓ Ez etorri baraurik
- ✓ Hidratatuta egon

### Odola eman ondoren:

- ✓ Ez egin jarduera fisiko handirik odola eman ondorengo 12-24 orduetan
- ✓ Ez erre eta ez edan alkoholik hurrengo 2 orduetan



MAPAC informea



Platelet Thresholds for Patients on Chemotherapy



Platelets transfusion for patients with hypoproliferative thrombocytopenia